



البرنامج الوطني للقاحات الأساسية

| عمر الطفل | اللقاح | الجرعة |
|--|--|---------------------------|
| عند الولادة (خلال الساعات الأولى في المستشفى) | صفيرة "ب" Hepatitis B | جرعة صفر (في المستشفى) |
| شهران | شلل عضلي IPV | جرعة أولى |
| | خماسي (شاهوق، خناق، كزاز، هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب) | |
| 4 أشهر | شلل فموي OPV | جرعة ثانية |
| | خماسي (شاهوق، خناق، كزاز، هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب) | جرعة أولى |
| | لقاح المكورات الرئوية المقترن PCV13 | |
| 6 أشهر | شلل فموي OPV | جرعة ثالثة |
| | خماسي (شاهوق، خناق، كزاز، هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب) | جرعة ثانية |
| | لقاح المكورات الرئوية المقترن PCV13 | |
| 9 أشهر | الحصبة | جرعة صفر |
| 12 شهر | حصبة، حصبة ألمانية، أبو كعب (MMR) | جرعة أولى |
| | لقاح المكورات الرئوية المقترن PCV13 | جرعة تذكيرية |
| 18 شهراً | شلل فموي OPV | تذكير أول |
| | خماسي (شاهوق، خناق، كزاز، هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب) | |
| | حصبة، حصبة ألمانية، أبو كعب (MMR) | جرعة ثانية |
| 4-5 سنوات | شلل فموي OPV | تذكير ثاني |
| | ثلاثي (شاهوق، خناق، كزاز) | |
| 10-12 سنة | شلل فموي OPV | تذكير ثالث |
| | ثنائي (خناق، كزاز) | |
| 16-18 سنة | شلل فموي OPV | تذكير رابع |
| | ثنائي (خناق، كزاز) | |